

NOME:

ATIVIDADE DE PESQUISA – PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

1. A administração de medicamento pela via intramuscular possibilita que o fármaco seja injetado exatamente no músculo. É permitido, que no adulto seja administrado de 4 a 5mL. **Apresente as vias mais indicadas.**

2. Uma das vias mais importante de medicamentos é a via Intramuscular, pois, é a segunda mais rápida de absorção ficando atrás da via endovenosa. **Quais são as vias de administração intramuscular?**

3. Que técnica de injeção intramuscular evita que o medicamento extravase dentro do tecido subcutâneo?

4. Leias as afirmativas.

I. Região ventroglútea ou Hochstetter é a primeira opção de escolha entre as intramusculares, uma vez que é de fácil acesso, seguro, distante de nervos e vasos sanguíneos e que suporta grande volume de fármaco.

II. Técnica em Z para a realização de injeção intramuscular minimiza a irritação da pele, pois promove o selamento do local onde o medicamento foi depositado.

III. Injeção intramuscular na região da FALC - Face Ântero-Lateral da Coxa é realizada no músculo vasto lateral da coxa.

IV. Via intramuscular é uma via enteral para a administração de fármacos, com finalidade profilática ou terapêutica, na qual se realiza a punção de um músculo com uma agulha acoplada a uma seringa.

INDIQUE AS ALTERNATIVAS CORRETAS/INCORRETAS JUSTIFICANDO SUA RESPOSTA.

5. A região deltoidea é acessível, porém há um volume suportado nessa área. Estabeleça o mL indicado para esse local.

6. A região glútea é a mais indicada e preferida quando as injeções são dolorosas e de difícil absorção. Por quê?

7. Qual o volume máximo pode ser injetado no musculo deltoide?

8. Leia as afirmativas abaixo em relação à seleção do local para uma injeção intramuscular.

I- Um dos cuidados a considerar se relaciona com a distância do local escolhido em relação a vasos, nervos e musculatura para absorver o medicamento.

II- A espessura do tecido adiposo não interfere na escolha da via intramuscular, já que é no músculo.

III- A idade do indivíduo não interfere na escolha do local, pois o que é importante é o tipo de agulha.

IV- Os únicos locais para a aplicação da via intramuscular são: deltoide e o ventroglúteo.

INDIQUE AS ALTERNATIVAS CORRETAS/INCORRETAS JUSTIFICANDO SUA RESPOSTA.

OBSERVAÇÃO: RESPONDER EM FOLHA ANEXADA E ENTREGAR NA PRÓXIMA AULA.